Empfehlung *Notfallmedikamente & Antidota* vom 21.07.2026 – ***Anhang 2: Verdünnungsliste***

Freiname (INN)	Konzentration	Verdünnung / Rekonstitution	Endkonzentration	Bemerkungen
Acetylsalicylsäure (ASS)	500 mg	**Original-Trockensubstanz** + **5 ml** Aqua ad inj.	**87,5 mg / ml** (5 ml Spritze)	*Rekonstitution nur mit Aqua ad iniectabilia Volumenzunahme bei Rekonstitution (ca. + 0,7 ml)*
Atropinsulfat	100 mg / 10 ml	**10 ml** Originalkonzentration + **40 ml** NaCl 0,9%	**2 mg / ml** (50 ml **Spritzenpumpe**)	*zur besseren Dosierbarkeit (Empfehlung: eskalierend nach Wirkung 2-4-8-16-… mg); Filter verwenden!*
Ceftriaxon	2,0 g	**Original-Trockensubstanz** + **40 ml** NaCl 0,9%	**50 mg / ml Kurzinfusion**	*Keine parallele Applikation von calciumhaltigen Lösungen (auch bal. Elektrolytlösungen) – siehe Fachinfo!*
Epinephrin (Adrenalin)	1 mg / 1 ml	**1 ml** Originalkonzentration + **9 ml** NaCl 0,9%	**0,1 mg / ml** (10 ml Spritze)	*Gebrauchslösung geeignet zur fraktionierten i.v.-Gabe, z. B. bei Säuglingsreanimation*
Epinephrin (Adrenalin)	25 mg / 25 ml	**5 ml** Originalkonzentration + **45 ml** NaCl 0,9%	**0,1 mg / ml** (50 ml **Spritzenpumpe**)	*zur kontinuierlichen Applikation über Spritzenpumpe, z. B. bei ROSC*
Esketamin	50 mg / 2 ml	**2 ml** Originalkonzentration + **8 ml** NaCl 0,9%	**5 mg / ml** (10 ml Spritze)	
Fenoterol	25 µg / 1 ml	**1 ml** Originalkonzentration + **4 ml** NaCl 0,9%	**5 µg / ml** (5 ml Spritze)	
Heparin	25.000 IE / 5 ml	**1 ml unverdünnt in 2 ml Spritze**	**5.000 IE / ml** (2 ml Spritze)	*Standard-Dosierung zur Vermeidung von Dosierungsfehlern*
Hydroxocobalamin	5,0 g	**Original-Trockensubstanz** + **200 ml** NaCl 0,9%	**25 mg / ml Kurzinfusion**	
Metamizol	1,0 g / 2 ml	**2 ml** Originalkonzentration + **100 ml** NaCl 0,9%	**Kurzinfusion**	
Morphin	10 mg / 1 ml	**1 ml** Originalkonzentration + **9 ml** NaCl 0,9%	**1 mg / ml** (10 ml Spritze)	
Naloxon	0,4 mg / 1 ml	**1 ml** Originalkonzentration + **3 ml** NaCl 0,9%	**0,1 mg / ml** (5 ml Spritze)	
Norepinephrin (Noradrenalin)	25 mg / 25 ml **bzw.** 10 mg / 10 ml	**1 ml** Originalkonzentration + **99 ml** NaCl 0,9%	**0,01 mg / ml** (z. B. 10 ml Spritze)	*Gebrauchslösung geeignet zur fraktionierten i.v.-Gabe z. B zur Therapie der Hypotension*
Norepinephrin (Noradrenalin)	25 mg / 25 ml **bzw.** 10 mg / 10 ml	**5 ml** Originalkonzentration + **45 ml** NaCl 0,9%	**0,1 mg / ml** (50 ml **Spritzenpumpe**)	*zur kontinuierlichen Applikation über Spritzenpumpe, z.B. bei Schock*
Oxytocin	3 IE / 1 ml	**3 ml** Originalkonzentration + **42 ml** NaCl 0,9%	**0,2 IE / ml** (45 ml **Spritzenpumpe**)	*ggf. zusätzlich zur Bolusgabe über Spritzenpumpe, z. B. (10-20-30-40-) 50 ml/h → (2-4-6-8-) 10 IE/h*
Piritramid	7,5 mg / 1 ml	**1 ml** Originalkonzentration + **100 ml** NaCl 0,9%	**Kurzinfusion**	
Prednisolon	250 mg	**Original-Trockensubstanz** + **5 ml** Aqua ad inj.	**50 mg / ml** (5 ml Spritze)	*Rekonstitution nur mit zugehörigem Lösungsmittel (Aqua ad iniectabilia)*
Tenecteplase	10.000 U / 50 mg	**Fertigspritze mit Lösungsmittel im Set**	**1.000 U (5 mg) / ml** (in 10 ml Spritze)	
Thiopental	500 mg	**Original-Trockensubstanz** + **20 ml** Aqua ad inj.	**25 mg/ml** (20 ml Spritze)	*Rekonstitution nur mit Aqua ad iniectabilia*