Empfehlung des RDA:

Anwendung von Hydroxocobalamin

KORREKTE INDIKATIONSSTELLUNG BEACHTEN:

Gabe von **Hydroxocobalamin** bei **Rauchgas- und/oder Zyanidintoxikation** mit

persistierender Bewusstseinstrübung (Glasgow Coma Scale 9–10) oder
Bewusstlosigkeit (Glasgow Coma Scale ≤ 8) oder ***Krampfanfällen****

und

nicht anders erklärbarer ***Hypotonie*** ($RR_{syst.}$ < 90mmHg) oder
Bradykardie oder ***Herzstillstand****

und

metabolischer Azidose mit einer
Serum-Laktatkonzentration > 8-10 mmol/l (falls Messung verfügbar)*

* Zellner T et al: *„Inhalationstrauma durch Rauchgas bei Bränden“* Notfall Rettungsmed 22:322–329 (2019)

Dieser Hinweis entbindet nicht von der Kenntnis und Beachtung der Fachinformation zu Hydroxocobalamin!

Empfehlung des RDA:

Anwendung von Hydroxocobalamin

KORREKTE INDIKATIONSSTELLUNG BEACHTEN:

Gabe von **Hydroxocobalamin** bei **Rauchgas- und/oder Zyanidintoxikation** mit

persistierender Bewusstseinstrübung (Glasgow Coma Scale 9–10) oder
Bewusstlosigkeit (Glasgow Coma Scale ≤ 8) oder ***Krampfanfällen*** *

und

nicht anders erklärbarer ***Hypotonie*** ($RR_{syst.}$ < 90mmHg) oder
Bradykardie oder ***Herzstillstand*** *

und

metabolischer Azidose mit einer
Serum-Laktatkonzentration > 8-10 mmol/l (falls Messung verfügbar) *

* Zellner T et al: *„Inhalationstrauma durch Rauchgas bei Bränden“* Notfall Rettungsmed 22: 322–329 (2019)

Dieser Hinweis entbindet nicht von der Kenntnis und Beachtung der Fachinformation zu Hydroxocobalamin!